

CHIRURGIE

ALS GESPECIALISEERDE HUISARTSEN VERRICHT **MEDISCH KWARTIER NAARDEN - VESTING** DIVERSE CHIRURGISCHE INGREPEN ONDER LOKALE VERDOVING:

- ◆ Ooglidcorrecties
- ◆ Sterilisaties bij mannen
- ◆ Schaamlipcorrecties
- ◆ Diagnostiek en behandeling van zwellingen
- ◆ Overige huidchirurgie

Nog altijd wordt gedacht dat deze ingrepen alleen in gespecialiseerde en vaak dure klinieken kunnen plaats vinden. Niets is minder waar want ook in onze huisartsenpraktijk (MKNV) kunt u hiervoor terecht.

Omdat persoonlijke zorg en aandacht bij ons altijd voorop staan, nodigen wij u uit voor een gesprek waarin we uitgebreid uitleggen hoe de behandeling in zijn werk zal gaan. Hierin kunt u uw verwachtingen en eventuele vragen bespreken.

De ingreep zal kort hierop plaats kunnen vinden en wordt altijd gevolgd door een controleafspraak. In de tussentijdse herstelperiode kunt u contact met ons opnemen via een (speciaal) mobiel nummer:



OOGLEIDCORRECTIE

Een teveel aan huid van het bovenooglid kan verholpen worden door een ooglidcorrectie. Klachten zijn vaak afhangede oogleden, vermoeid gevoel en/of een vermoeid uiterlijk. Ook hoofdpijnklachten of daadwerkelijk verminderd gezichtsveld komen veel voor.

Tijdsduur ingreep: ± 75 min

Herstelperiode: ± 1 week

Controlemomenten: Na 1 week en 5 weken

De meeste mensen hebben na 1 week hun normale activiteiten weer opgepakt. Vijf weken later is er een laatste controle.

STERILISATIES BIJ MANNEN

De meest betrouwbare anticonceptie voor mannen is sterilisatie. Een kleine ingreep waarbij een stukje zaadleider wordt verwijderd en de uiteinden worden afgesloten. De meeste mannen kunnen hun werk de volgende dag weer hervatten. Advies is om de eerste drie dagen rustig aan te doen. De eerste 2-3 maanden bent u nog wel vruchtbaar.

Tijdsduur ingreep: ± 45 min

Herstelperiode: ± 3 dagen

Controlemomenten: Na 1 week en inleveren sperma na 2-3 maanden



SCHAAMLIPCORRECTIES

De vorm of grootte van uw schaamlippen kan pijn of ongemak geven bij dagelijkse bezigheden als fietsen, paardrijden of vrijen. Dit probleem kan met een relatief eenvoudige ingreep, onder plaatselijke verdoving, worden verholpen. Door de goede doorbloeding in de schaamlippen, geneest de wond erg snel en kunnen de hechtingen na een week al verwijderd worden.

Tijdsduur ingreep: ± 75 min

Herstelperiode: ± 1-2 weken

Controlemomenten: hechtingen verwijderen na 1 week



DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN ZWELLINGEN

Zwellingen in de huid, zoals vetbulten, talgklierzystes en ganglia (uitstulping van de koker waar de pees doorheen loopt, bijv. bij de pols), kunnen vaak onder lokale verdoving verwijderd worden. Afhankelijk van het vooronderzoek en een echografie wordt de tijdsduur van de ingreep en de herstelperiode vastgesteld.

Tijdsduur ingreep: ± 30 minuten

Herstelperiode: ± 1 dag – 1 week

Controlemomenten: hechtingen verwijderen na 1 week



OVERIGE HUIDCHIRURGIE

Naast bovenstaande ingrepen kunt u bij ons ook terecht voor de behandeling van lokale huidafwijkingen als moedervlekken, wratten, fibromen (gesteelde wratten) of niet fraai genezen littekens. Indien noodzakelijk of gewenst vindt er onderzoek van het weefsel plaats. Neem contact met ons op of maak een afspraak voor de tijdsduur en herstelperiode van deze ingrepen.



CONTACT

035 - 694 38 10

Turfpoortstraat 26 | 411 EG Naarden

www.mknv.nl